

glu

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek TROXERUTIN ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

TROXERUTIN SYNTEZA

(O-β-hydroxyethylrutosidae)

200 mg kapsułki twarde

Skład:

1 kapsułka zawiera:

substancja czynna: 200 mg O-β-hydroksyetylorutozydu

substancje pomocnicze: laktoza, skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna, laurylosiarczan sodu, erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa (E 110), żelatyna.

Opakowania:

64 kapsułki

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „SYNTEZA” Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 67/71,

61-005 Poznań

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek TROXERUTIN SYNTEZA i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek TROXERUTIN SYNTEZA
3. Jak stosować lek TROXERUTIN SYNTEZA
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku TROXERUTIN SYNTEZA
6. Inne informacje

1. Co to jest lek TROXERUTIN SYNTEZA i w jakim celu się go stosuje

Substancjami czynnymi leku są hydroksyetylorutozydy pochodne flawonowe – FAD i FAD-H₂ (flawono-adenozyno-difosforany). Hydroksyetylorutozydy zmniejszają aktywność transaminazy alaninowej – wywierają działanie ochronne na komórki wątroby, hamują agregację i zwiększają plastyczność krwinek czerwonych. Przyjmowanie hydroksyetylorutozydów poprawia napięcie i elastyczność włosowatych naczyń krwionośnych i limfatycznych, zmniejsza ich przepuszczalność. Usprawnia przepływ krwi i limfy. W trakcie leczenia produktem TROXERUTIN SYNTEZA, obserwuje się przesiąkanie fibrynogenu i mniejszą tendencję do tworzenia się mankietów fibrynogenowych wokół naczyń. Poprawia się wysycenie krwi żyłnej tlenem. Wpływa to korzystnie na wymianę gazową i dostęp produktów odżywczych, a także na przemianę materii na poziomie komórek. Nie stwierdzono ujemnego wpływu na układ krzepnięcia krwi, na podstawie obrazu morfologicznego krwi.

TROXERUTIN SYNTEZA stosuje się w leczeniu objawów zaburzeń krążenia żylnego i limfatycznego szczególnie w kończynach dolnych z objawami ciężkości i bólu nóg, kurczów nocnych, żylaków oraz w łagodzeniu objawów związanych z obecnością żylaków odbytu (hemoroidów).

2. Zanim zastosuje się lek TROXERUTIN SYNTEZA

Nie ma przeciwwskazań do stosowania leku TROXERUTIN SYNTEZA.

Nie występują interakcje z innymi lekami lub substancjami pomocniczymi zawartymi w leku.

Stosowanie leku TROXERUTIN SYNTEZA z jedzeniem i pićm:

Zaleca się stosować lek w trakcie posiłków.

Stosowanie leku TROXERUTIN SYNTEZA u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma przeciwwskazań do stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

TROXERUTIN SYNTEZA nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku TROXERUTIN SYNTEZA

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków:

TROXERUTIN SYNTEZA może być stosowany z innymi lekami. Nie wpływa na wyniki podstawowych badań laboratoryjnych. Lek ogranicza aktywność prokoagulacyjną osocza krwi.

3. Jak stosować lek TROXERUTIN SYNTEZA

Lek stosuje się doustnie.

Zaleca się stosować lek w trakcie posiłków. TROXERUTIN przyjmuje się 3 razy na dobę po 2 kapsułki przez okres 4 do 6 tygodni.

Lekarz może zalecić kontynuowanie terapii jeszcze przez kilka tygodni.

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana:

Brak doniesień o przypadkach przedawkowania leku. W razie zażycia znaczących ilości leku należy spowodować opróżnienie żołądka i zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku TROXERUTIN:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek TROXERUTIN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek jest dobrze tolerowany. Niezbyt często mogą wystąpić: świąd skóry, wysypka, przemijające nudności i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, zaburzenia snu. Zaleca się zmniejszenie dawki lub okresowe odstawienie leku. Lek może powodować reakcje alergiczne ze względu na zawartość barwników w otoczce kapsułki.

5. Przechowywanie leku TROXERUTIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25⁰C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku TROXERUTIN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „SYNTEZA” Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 67/71,

61-005 Poznań

tel. 061 879-20-81

Data opracowania ulotki:

2008 -12- 12

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15