

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek TROXESCORBIN ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

TROXESCORBIN

50 mg + 200 mg kapsułki twarde

(O-β-hydroxyethylrutosidae + Acidum ascorbicum)

Skład:

1 kapsułka zawiera:

substancje czynne: O-β-hydroksyetylorutozyd 50 mg, kwas askorbowy 200 mg,

substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, żelatyna, indygotyna (E132), żółcień chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa (E110), tytanu dwutlenek (E171).

Opakowania:

20 kapsulek

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „SYNTEZA” Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 67/71, 61-005 Poznań

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek TROXESCORBIN i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek TROXESCORBIN
3. Jak stosować lek TROXESCORBIN
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku TROXESCORBIN
6. Inne informacje

1. Co to jest lek TROXESCORBIN i w jakim celu się go stosuje

TROXESCORBIN, kapsułki twarde, o barwie niebiesko-żółtej, o kształcie cylindrycznych rurek zakończonych półkolisto, zawiera O- β -hydroksyetylorutozyd oraz kwas askorbowy.

TROXESCORBIN to preparat w którym wykorzystano działanie poszczególnych substancji czynnych z osobna jak i ich łączne działanie. O- β -hydroksyetylorutozyd jest mieszaniną rutozydów należących do grupy glikozydów flawonowych, które hamują procesy autooksydacji unieczynniając wolne rodniki i nadtlenki kwasów tłuszczowych. Wywiera działanie ochronne na naczynia krwionośne, uszczelnia śródbłonek i przywraca elastyczność ich ścianom.

O- β -hydroksyetylorutozyd zapobiega nefropatii i retinopatii u chorych na cukrzycę. Poza tym zmniejsza stężenie fibrynogenu w osoczu oraz zwiększa zdolność erytrocytów do deformacji wpływając na poprawę własności przepływu krwi.

Kwas askorbowy pełni ważną rolę w procesach utleniania i redukcji. Wpływa na przemianę aminokwasów aromatycznych, metabolizm tyroksyny, syntezę katecholamin, hormonów steroidowych, insuliny, norepinefryny i histaminy. Bierze udział w fosforylacji glukozy i syntezy glikogenu. Niedobór witaminy C powoduje zaburzenia syntezы kwasu hialuronowego oraz nieprawidłowe funkcjonowanie tkanki łącznej i procesów kostnienia. Witamina C ułatwia wchłanianie żelaza i przez to syntezę hemoglobiny. Umożliwia także syntezę interferonu i tworzenie przeciwciał. Połączenie O- β -hydroksyetylorutozydu z kwasem askorbowym daje efekt synergistyczny w zakresie antyoksydacyjnym w reakcjach z udziałem: żelaza, miedzi i innych metali. TROXESCORBIN stosuje się wspomagająco w leczeniu nadmiernej przepuszczalności naczyń włosowatych, w zaburzeniach krążenia żylnego i limfatycznego, szczególnie w obrębie kończyn dolnych (żylaki, stany przedżylakowe, obrzęki i zapalenie skóry towarzyszące żylakom), żylakach odbytu.

2. Zanim zastosuje się lek TROXESCORBIN

Nie należy stosować leku TROXESCORBIN jeżeli stwierdzono:

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ostrożnie stosować w kamicy dróg żółciowych, moczowych, dnie, oksalurii, talasemii, anemii syderoblastycznej, hemochromatozie, deficycie krwinkowej dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (G-6-PD).

Większe dawki witaminy C mogą fałszować wyniki testów na stężenie glukozy.

Stosowanie leku TROXESCORBIN z jedzeniem i piciem:

Lek może być przyjmowany przed posiłkiem, w jego trakcie lub po jedzeniu.

Zachować szczególną ostrożności stosując TROXESCORBIN:

TROXESCORBIN stosowany według wskazań i zgodnie z zaleconym dawkowaniem jest lekiem bezpiecznym.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować – nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować – nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

TROXESCORBIN nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Duże dawki kwasu askorbinowego nasilają toksyczne działanie sulfonamidów. Przekroczenie dawki zalecanej może osłabić działanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz nasilać działanie kumarynowych leków przeciwzakrzepowych, zwiększać wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego oraz wydłużać okres wydalania paracetamolu.

3. Jak stosować lek TROXESCORBIN

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek stosuje się doustnie. Zapobiegawczo i leczniczo przyjmuje się 1-3 kapsułek na dobę. Lek powinno się przyjmować bezpośrednio po posiłkach. Popijają najlepiej wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana:

Preparat jest nietoksyczny po podaniu doustnym. W razie zażycia znaczących ilości leku należy spowodować opróżnienie żołądka i zgłosić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku TROXESCORBIN:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek TROXESCORBIN może powodować działania niepożądane.

O- β -hydroksyetylorutozyd bardzo rzadko powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe, napadowe zaczerwienienie twarzy, bóle głowy lub pokrzywkę. Podczas długotrwałego stosowania wysokich dawek witaminy C (powyżej 600 mg na dobę) mogą wystąpić: wymioty lub nudności, ból głowy, zaczerwienienie, zwiększone oddawanie moczu. W dawkach powyżej 1 g witaminy C na dobę mogą wystąpić: biegunka i kamica nerkowa.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku TROXESCORBIN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku TROXESCORBIN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „SYNTEZA” Sp. z o.o. w Poznaniu

ul. Św. Michała 67/71,

61-005 Poznań

tel. 0 61 8792081

Data opracowania ulotki:

2008-12-15
MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15